

APPENDICE

4.B3

PATATE

(g/ die)

PATATE**Tabella 1.A.d.1(a)** - *Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "PATATE" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale*

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	27	27	16	61	61
	Nord occidentale	5	11	10	18	21	21
	Nord orientale	4	44	45	36	103	103
	Sud-Isole	9	11	19	0	47	47
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>20</i>	<i>27</i>	<i>12</i>	<i>61</i>	<i>103</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	83	54	70	168	168
	Nord occidentale	23	35	40	12	115	136
	Nord orientale	17	61	46	63	164	164
	Sud-Isole	45	39 ^(▲)	42 ^(▲)	21 ^(▲)	108	173
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>48^(▲)</i>	<i>46^(▲)</i>	<i>49^(▲)</i>	<i>144</i>	<i>173</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	67	54	75	167	194
	Nord occidentale	29	56	53	51	176	191
	Nord orientale	25	54	56	51	147	174
	Sud-Isole	60	47 ^(▲)	53 ^(▲)	27 ^(▲)	147	165
	<i>TOTALE</i>	<i>139</i>	<i>54^(▲)</i>	<i>54^(▲)</i>	<i>49^(▲)</i>	<i>161</i>	<i>191</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	50 ^(▲)	58 ^(▲)	33 ^(▲)	161 ^(▲)	211
	Nord occidentale	320	48 ^(▲)	53 ^(▲)	38 ^(▲)	145 ^(▲)	192
	Nord orientale	237	47 ^(▲)	57 ^(▲)	27 ^(▲)	157 ^(▲)	230
	Sud-Isole	440	43 ^(▲)	49 ^(▲)	34 ^(▲)	133 ^(▲)	190
	<i>TOTALE</i>	<i>1245</i>	<i>47^(▲)</i>	<i>53^(▲)</i>	<i>34^(▲)</i>	<i>146^(▲)</i>	<i>200^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	49 ^(▲)	62 ^(▲)	15 ^(▲)	167	263
	Nord occidentale	96	54 ^(▲)	56 ^(▲)	47 ^(▲)	156	245
	Nord orientale	65	60 ^(▲)	60 ^(▲)	58 ^(▲)	170	252
	Sud-Isole	91	41 ^(▲)	43 ^(▲)	33 ^(▲)	120	163
	<i>TOTALE</i>	<i>316</i>	<i>51^(▲)</i>	<i>55^(▲)</i>	<i>41^(▲)</i>	<i>156^(▲)</i>	<i>238</i>
TOTALE	Centro	356	52 ^(▲)	58 ^(▲)	38 ^(▲)	167 ^(▲)	220
	Nord occidentale	473	48 ^(▲)	53 ^(▲)	39 ^(▲)	146 ^(▲)	200
	Nord orientale	348	50 ^(▲)	57 ^(▲)	40 ^(▲)	164 ^(▲)	233
	Sud-Isole	645	43 ^(▲)	48 ^(▲)	34 ^(▲)	132 ^(▲)	179
	<i>TOTALE</i>	<i>1822</i>	<i>48^(▲)</i>	<i>53^(▲)</i>	<i>38^(▲)</i>	<i>147^(▲)</i>	<i>202^(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.d.1(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "PATATE" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	16	23	3	50	50
	Nord occidentale	5	17	37	0	84	84
	Nord orientale	6	18	33	4	85	85
	Sud-Isole	12	12	23	0	79	79
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>15</i>	<i>27</i>	<i>0</i>	<i>84</i>	<i>85</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	40	40	39	145	145
	Nord occidentale	25	49	44	32	131	158
	Nord orientale	12	61	56	54	187	187
	Sud-Isole	42	42(▲)	49(▲)	32(▲)	141	173
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>46(▲)</i>	<i>47(▲)</i>	<i>39(▲)</i>	<i>145</i>	<i>187</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	91	80	87	248	327
	Nord occidentale	32	67(▲)	63(▲)	54(▲)	186	217
	Nord orientale	19	55	73	10	233	233
	Sud-Isole	37	65(▲)	57(▲)	65(▲)	143	219
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>69(▲)</i>	<i>66(▲)</i>	<i>64(▲)</i>	<i>186</i>	<i>233</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	61(▲)	65(▲)	57(▲)	184(▲)	281
	Nord occidentale	271	55(▲)	56(▲)	45(▲)	167(▲)	233
	Nord orientale	213	58(▲)	58(▲)	59(▲)	161(▲)	226
	Sud-Isole	397	49(▲)	54(▲)	41(▲)	156(▲)	195
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>54(▲)</i>	<i>57(▲)</i>	<i>48(▲)</i>	<i>163(▲)</i>	<i>229(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	66(▲)	62(▲)	59(▲)	221	233
	Nord occidentale	51	64(▲)	64(▲)	50(▲)	165	300
	Nord orientale	44	57(▲)	54(▲)	54(▲)	155	215
	Sud-Isole	68	60(▲)	52(▲)	58(▲)	159	222
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>61(▲)</i>	<i>57(▲)</i>	<i>57(▲)</i>	<i>165(▲)</i>	<i>222</i>
TOTALE	Centro	267	62(▲)	65(▲)	57(▲)	176(▲)	281
	Nord occidentale	384	56(▲)	57(▲)	46(▲)	165(▲)	233
	Nord orientale	294	57(▲)	58(▲)	56(▲)	165(▲)	230
	Sud-Isole	556	50(▲)	53(▲)	45(▲)	152(▲)	195
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>55(▲)</i>	<i>57(▲)</i>	<i>48(▲)</i>	<i>163(▲)</i>	<i>226(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.d.1(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "PATATE" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	21	24	7	61	61
	Nord occidentale	10	14	26	1	84	84
	Nord orientale	10	28	38	12	103	103
	Sud-Isole	21	12	21	0	47	79
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>17^(▲)</i>	<i>27^(▲)</i>	<i>2^(▲)</i>	<i>84</i>	<i>103</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	61	51	58	145	168
	Nord occidentale	48	42 ^(▲)	43 ^(▲)	25 ^(▲)	131	158
	Nord orientale	29	61	50	59	164	187
	Sud-Isole	87	41 ^(▲)	45 ^(▲)	30 ^(▲)	113	173
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>47^(▲)</i>	<i>47^(▲)</i>	<i>43^(▲)</i>	<i>144^(▲)</i>	<i>173</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	78 ^(▲)	67 ^(▲)	78 ^(▲)	170	327
	Nord occidentale	61	62 ^(▲)	58 ^(▲)	51 ^(▲)	176	217
	Nord orientale	44	54 ^(▲)	63 ^(▲)	36 ^(▲)	174	233
	Sud-Isole	97	54 ^(▲)	55 ^(▲)	49 ^(▲)	147	219
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>60^(▲)</i>	<i>60^(▲)</i>	<i>51^(▲)</i>	<i>167^(▲)</i>	<i>219</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	55 ^(▲)	61 ^(▲)	46 ^(▲)	173 ^(▲)	229
	Nord occidentale	591	51 ^(▲)	54 ^(▲)	41 ^(▲)	150 ^(▲)	219
	Nord orientale	450	52 ^(▲)	57 ^(▲)	48 ^(▲)	157 ^(▲)	230
	Sud-Isole	837	46 ^(▲)	51 ^(▲)	39 ^(▲)	145 ^(▲)	193 ^(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>2313</i>	<i>50^(▲)</i>	<i>55^(▲)</i>	<i>41^(▲)</i>	<i>156^(▲)</i>	<i>219^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	55 ^(▲)	62 ^(▲)	47 ^(▲)	169	238
	Nord occidentale	147	58 ^(▲)	59 ^(▲)	47 ^(▲)	161	245
	Nord orientale	109	59 ^(▲)	57 ^(▲)	58 ^(▲)	165	234
	Sud-Isole	159	49 ^(▲)	48 ^(▲)	47 ^(▲)	142	175
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>55^(▲)</i>	<i>56^(▲)</i>	<i>47^(▲)</i>	<i>161^(▲)</i>	<i>234</i>
TOTALE	Centro	623	56 ^(▲)	61 ^(▲)	48 ^(▲)	169 ^(▲)	238
	Nord occidentale	857	52 ^(▲)	55 ^(▲)	41 ^(▲)	150 ^(▲)	219 ^(▲)
	Nord orientale	642	54 ^(▲)	57 ^(▲)	49 ^(▲)	164 ^(▲)	230
	Sud-Isole	1201	46 ^(▲)	51 ^(▲)	39 ^(▲)	143 ^(▲)	190 ^(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>3323</i>	<i>51^(▲)</i>	<i>55^(▲)</i>	<i>42^(▲)</i>	<i>156^(▲)</i>	<i>220^(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.d.2(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "PATATE" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	4	80	33	26	32	61	61
	Nord occidentale	3	60	19	2	18	21	21
	Nord orientale	4	100	44	45	36	103	103
	Sud-Isole	3	33	33	18	41	47	47
	<i>TOTALE</i>	<i>14</i>	<i>61</i>	<i>33</i>	<i>27</i>	<i>20</i>	<i>103</i>	<i>103</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	13	93	90	50	72	168	168
	Nord occidentale	17	74	47	40	50	136	136
	Nord orientale	15	88	69	42	63	164	164
	Sud-Isole	30	67	59 ^(▲)	38 ^(▲)	59 ^(▲)	108	173
	<i>TOTALE</i>	<i>75</i>	<i>76</i>	<i>64^(▲)</i>	<i>43^(▲)</i>	<i>59^(▲)</i>	<i>145</i>	<i>173</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	22	88	76	51	78	167	194
	Nord occidentale	20	69	81	45	73	184	191
	Nord orientale	15	60	90	43	86	174	174
	Sud-Isole	39	65	72 ^(▲)	50 ^(▲)	65 ^(▲)	161	165
	<i>TOTALE</i>	<i>96</i>	<i>69</i>	<i>78^(▲)</i>	<i>48^(▲)</i>	<i>73^(▲)</i>	<i>167</i>	<i>194</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	166	67	75 ^(▲)	56 ^(▲)	63 ^(▲)	176 ^(▲)	220
	Nord occidentale	229	72	67 ^(▲)	51 ^(▲)	63 ^(▲)	150 ^(▲)	200
	Nord orientale	158	67	70 ^(▲)	57 ^(▲)	63 ^(▲)	178	233
	Sud-Isole	280	64	68 ^(▲)	45 ^(▲)	59 ^(▲)	161 ^(▲)	195
	<i>TOTALE</i>	<i>833</i>	<i>67</i>	<i>70^(▲)</i>	<i>51^(▲)</i>	<i>63^(▲)</i>	<i>163^(▲)</i>	<i>220^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	42	66	75 ^(▲)	63 ^(▲)	64 ^(▲)	202	263
	Nord occidentale	76	79	69 ^(▲)	54 ^(▲)	59 ^(▲)	183	245
	Nord orientale	51	78	76 ^(▲)	57 ^(▲)	64 ^(▲)	171	252
	Sud-Isole	59	65	64 ^(▲)	38 ^(▲)	57 ^(▲)	130	163
	<i>TOTALE</i>	<i>228</i>	<i>72</i>	<i>70^(▲)</i>	<i>53^(▲)</i>	<i>59^(▲)</i>	<i>167^(▲)</i>	<i>245</i>
TOTALE	Centro	247	69	75 ^(▲)	56 ^(▲)	65 ^(▲)	176 ^(▲)	238
	Nord occidentale	345	73	66 ^(▲)	51 ^(▲)	63 ^(▲)	150 ^(▲)	220
	Nord orientale	243	70	72 ^(▲)	55 ^(▲)	63 ^(▲)	171 ^(▲)	234
	Sud-Isole	411	64	67 ^(▲)	44 ^(▲)	59 ^(▲)	156 ^(▲)	190
	<i>TOTALE</i>	<i>1246</i>	<i>68</i>	<i>70^(▲)</i>	<i>51^(▲)</i>	<i>63^(▲)</i>	<i>163^(▲)</i>	<i>229^(▲)</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.d.2(b) - *Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "PATATE" per classi di età e area geografica: MASCHI dei soli consumatori*

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	3	50	33	23	42	50	50
	Nord occidentale	2	40	44	58	44	84	84
	Nord orientale	3	50	36	43	16	85	85
	Sud-Isole	5	42	29	30	16	79	79
	<i>TOTALE</i>	<i>13</i>	<i>45</i>	<i>34</i>	<i>32</i>	<i>16</i>	<i>85</i>	<i>85</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	10	67	59	34	58	145	145
	Nord occidentale	21	84	59	42	50	131	158
	Nord orientale	9	75	81	50	65	187	187
	Sud-Isole	25	60	71	44	59	145	173
	<i>TOTALE</i>	<i>65</i>	<i>69</i>	<i>67^(▲)</i>	<i>43^(▲)</i>	<i>59^(▲)</i>	<i>145</i>	<i>187</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	17	85	107	76	98	327	327
	Nord occidentale	25	78	86	58	81	186	217
	Nord orientale	13	68	80	76	66	233	233
	Sud-Isole	28	76	86	49	87	143	219
	<i>TOTALE</i>	<i>83</i>	<i>77</i>	<i>89^(▲)</i>	<i>62^(▲)</i>	<i>82^(▲)</i>	<i>210</i>	<i>327</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	127	68	90 ^(▲)	61 ^(▲)	78 ^(▲)	207	281
	Nord occidentale	207	76	72 ^(▲)	53 ^(▲)	63 ^(▲)	169 ^(▲)	233
	Nord orientale	154	72	80 ^(▲)	53 ^(▲)	78 ^(▲)	181	230
	Sud-Isole	250	63	77 ^(▲)	49 ^(▲)	68 ^(▲)	163 ^(▲)	215
	<i>TOTALE</i>	<i>738</i>	<i>69</i>	<i>79^(▲)</i>	<i>53^(▲)</i>	<i>73^(▲)</i>	<i>179^(▲)</i>	<i>241</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	31	79	82 ^(▲)	58 ^(▲)	72 ^(▲)	221	233
	Nord occidentale	40	78	81 ^(▲)	61 ^(▲)	64 ^(▲)	165	300
	Nord orientale	34	77	74 ^(▲)	50 ^(▲)	64 ^(▲)	165	215
	Sud-Isole	50	74	81 ^(▲)	44 ^(▲)	65 ^(▲)	166	222
	<i>TOTALE</i>	<i>155</i>	<i>77</i>	<i>80^(▲)</i>	<i>53^(▲)</i>	<i>65^(▲)</i>	<i>166</i>	<i>233</i>
TOTALE	Centro	188	70	88 ^(▲)	61 ^(▲)	78 ^(▲)	207 ^(▲)	313
	Nord occidentale	295	77	73 ^(▲)	54 ^(▲)	63 ^(▲)	169 ^(▲)	241
	Nord orientale	213	72	79 ^(▲)	54 ^(▲)	74 ^(▲)	187 ^(▲)	230
	Sud-Isole	358	64	77 ^(▲)	48 ^(▲)	67 ^(▲)	163 ^(▲)	219
	<i>TOTALE</i>	<i>1054</i>	<i>70</i>	<i>78^(▲)</i>	<i>54^(▲)</i>	<i>69^(▲)</i>	<i>174^(▲)</i>	<i>233^(▲)</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.d.2(c) - *Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del gruppo alimentare "PATATE" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei soli consumatori*

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	7	64	33	23	42	61	61
	Nord occidentale	5	50	29	32	18	84	84
	Nord orientale	7	70	41	40	19	103	103
	Sud-Isole	8	38	30	25	23	79	79
	<i>TOTALE</i>	<i>27</i>	<i>52</i>	<i>33</i>	<i>29</i>	<i>19</i>	<i>85</i>	<i>103</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	23	79	76	46	61	145	168
	Nord occidentale	38	79	53 ^(▲)	41 ^(▲)	50 ^(▲)	136	158
	Nord orientale	24	83	74	45	64	164	187
	Sud-Isole	55	63	64 ^(▲)	41 ^(▲)	59 ^(▲)	145	173
	<i>TOTALE</i>	<i>140</i>	<i>73</i>	<i>65^(▲)</i>	<i>43^(▲)</i>	<i>59^(▲)</i>	<i>145</i>	<i>173</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	39	87	90 ^(▲)	64 ^(▲)	82 ^(▲)	194	327
	Nord occidentale	45	74	84 ^(▲)	53 ^(▲)	74 ^(▲)	186	217
	Nord orientale	28	64	86	59	85	210	233
	Sud-Isole	67	69	78 ^(▲)	50 ^(▲)	69 ^(▲)	147	219
	<i>TOTALE</i>	<i>179</i>	<i>72</i>	<i>83^(▲)</i>	<i>55^(▲)</i>	<i>78^(▲)</i>	<i>176^(▲)</i>	<i>233</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	293	67	82 ^(▲)	58 ^(▲)	76 ^(▲)	184 ^(▲)	281
	Nord occidentale	436	74	69 ^(▲)	52 ^(▲)	63 ^(▲)	161 ^(▲)	220
	Nord orientale	312	69	75 ^(▲)	55 ^(▲)	66 ^(▲)	179 ^(▲)	230
	Sud-Isole	530	63	73 ^(▲)	47 ^(▲)	63 ^(▲)	163 ^(▲)	195
	<i>TOTALE</i>	<i>1571</i>	<i>68</i>	<i>74^(▲)</i>	<i>53^(▲)</i>	<i>65^(▲)</i>	<i>169^(▲)</i>	<i>230^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	73	71	78 ^(▲)	61 ^(▲)	66 ^(▲)	221	263
	Nord occidentale	116	79	73 ^(▲)	57 ^(▲)	59 ^(▲)	166	245
	Nord orientale	85	78	75 ^(▲)	54 ^(▲)	64 ^(▲)	170	252
	Sud-Isole	109	69	72 ^(▲)	41 ^(▲)	59 ^(▲)	156	175
	<i>TOTALE</i>	<i>383</i>	<i>74</i>	<i>74^(▲)</i>	<i>53^(▲)</i>	<i>63^(▲)</i>	<i>166^(▲)</i>	<i>245</i>
TOTALE	Centro	435	70	81 ^(▲)	58 ^(▲)	72 ^(▲)	184 ^(▲)	263
	Nord occidentale	640	75	69 ^(▲)	53 ^(▲)	63 ^(▲)	164 ^(▲)	229
	Nord orientale	456	71	75 ^(▲)	54 ^(▲)	65 ^(▲)	178 ^(▲)	233
	Sud-Isole	769	64	72 ^(▲)	46 ^(▲)	63 ^(▲)	163 ^(▲)	195
	<i>TOTALE</i>	<i>2300</i>	<i>69</i>	<i>74^(▲)</i>	<i>52^(▲)</i>	<i>65^(▲)</i>	<i>168^(▲)</i>	<i>231^(▲)</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.d.3(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "PATATE E PIATTI A BASE DI PATATE, ESCLUSE LE PATATINE FRITTE" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	27	27	16	61	61
	Nord occidentale	5	11	10	18	21	21
	Nord orientale	4	44	45	36	103	103
	Sud-Isole	9	11	19	0	47	47
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>20</i>	<i>27</i>	<i>12</i>	<i>61</i>	<i>103</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	83	54	70	168	168
	Nord occidentale	23	30	36	12	82	119
	Nord orientale	17	58	47	55	164	164
	Sud-Isole	45	39 ^(▲)	42 ^(▲)	21 ^(▲)	108	173
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>46^(▲)</i>	<i>46^(▲)</i>	<i>47^(▲)</i>	<i>144</i>	<i>173</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	65	54	69	157	194
	Nord occidentale	29	54	54	51	176	191
	Nord orientale	25	53	54	51	147	158
	Sud-Isole	60	46 ^(▲)	53 ^(▲)	25 ^(▲)	147	163
	<i>TOTALE</i>	<i>139</i>	<i>52^(▲)</i>	<i>53^(▲)</i>	<i>49^(▲)</i>	<i>157</i>	<i>191</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	50 ^(▲)	58 ^(▲)	32 ^(▲)	161 ^(▲)	211
	Nord occidentale	320	47 ^(▲)	53 ^(▲)	34 ^(▲)	145 ^(▲)	192
	Nord orientale	237	46 ^(▲)	56 ^(▲)	27 ^(▲)	157 ^(▲)	230
	Sud-Isole	440	43 ^(▲)	49 ^(▲)	34 ^(▲)	131 ^(▲)	190
	<i>TOTALE</i>	<i>1245</i>	<i>46^(▲)</i>	<i>53^(▲)</i>	<i>33^(▲)</i>	<i>146^(▲)</i>	<i>199^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	49 ^(▲)	62 ^(▲)	15 ^(▲)	167	263
	Nord occidentale	96	54 ^(▲)	56 ^(▲)	47 ^(▲)	156	245
	Nord orientale	65	60 ^(▲)	60 ^(▲)	58 ^(▲)	170	252
	Sud-Isole	91	41 ^(▲)	43 ^(▲)	33 ^(▲)	120	163
	<i>TOTALE</i>	<i>316</i>	<i>51^(▲)</i>	<i>55^(▲)</i>	<i>41^(▲)</i>	<i>156^(▲)</i>	<i>238</i>
TOTALE	Centro	356	52 ^(▲)	58 ^(▲)	38 ^(▲)	167 ^(▲)	220
	Nord occidentale	473	48 ^(▲)	53 ^(▲)	37 ^(▲)	145 ^(▲)	200
	Nord orientale	348	50 ^(▲)	56 ^(▲)	40 ^(▲)	158 ^(▲)	233
	Sud-Isole	645	42 ^(▲)	48 ^(▲)	33 ^(▲)	131 ^(▲)	179
	<i>TOTALE</i>	<i>1822</i>	<i>47^(▲)</i>	<i>53^(▲)</i>	<i>35^(▲)</i>	<i>147^(▲)</i>	<i>200^(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.d.3(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "PATATE E PIATTI A BASE DI PATATE, ESCLUSE LE PATATINE FRITTE" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	16	23	3	50	50
	Nord occidentale	5	17	37	0	84	84
	Nord orientale	6	18	33	4	85	85
	Sud-Isole	12	9	23	0	79	79
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>14</i>	<i>27</i>	<i>0</i>	<i>84</i>	<i>85</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	39	41	39	145	145
	Nord occidentale	25	46	44	32	131	148
	Nord orientale	12	60	55	54	180	180
	Sud-Isole	42	41(▲)	49(▲)	19(▲)	141	173
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>44(▲)</i>	<i>47(▲)</i>	<i>37(▲)</i>	<i>145</i>	<i>180</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	90	81	82	248	327
	Nord occidentale	32	63(▲)	62(▲)	50(▲)	176	195
	Nord orientale	19	54	73	8	233	233
	Sud-Isole	37	62(▲)	56(▲)	65(▲)	143	204
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>66(▲)</i>	<i>66(▲)</i>	<i>56(▲)</i>	<i>176</i>	<i>233</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	61(▲)	66(▲)	57(▲)	184(▲)	281
	Nord occidentale	271	54(▲)	55(▲)	42(▲)	159(▲)	233
	Nord orientale	213	57(▲)	57(▲)	59(▲)	161(▲)	226
	Sud-Isole	397	48(▲)	54(▲)	41(▲)	156(▲)	195
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>54(▲)</i>	<i>57(▲)</i>	<i>48(▲)</i>	<i>163(▲)</i>	<i>229(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	66(▲)	62(▲)	59(▲)	221	233
	Nord occidentale	51	64(▲)	64(▲)	50(▲)	165	300
	Nord orientale	44	57(▲)	54(▲)	54(▲)	155	215
	Sud-Isole	68	60(▲)	52(▲)	58(▲)	159	222
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>61(▲)</i>	<i>57(▲)</i>	<i>57(▲)</i>	<i>165(▲)</i>	<i>222</i>
TOTALE	Centro	267	61(▲)	65(▲)	57(▲)	176(▲)	281
	Nord occidentale	384	55(▲)	56(▲)	44(▲)	161(▲)	233
	Nord orientale	294	56(▲)	57(▲)	51(▲)	165(▲)	230
	Sud-Isole	556	49(▲)	53(▲)	43(▲)	152(▲)	195
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>54(▲)</i>	<i>57(▲)</i>	<i>48(▲)</i>	<i>163(▲)</i>	<i>226(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.d.3(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "PATATE E PIATTI A BASE DI PATATE, ESCLUSE LE PATATINE FRITTE" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del *campione totale*

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	21	24	7	61	61
	Nord occidentale	10	14	26	1	84	84
	Nord orientale	10	28	38	12	103	103
	Sud-Isole	21	10	21	0	47	79
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>17(▲)</i>	<i>27(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>84</i>	<i>103</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	60	52	58	145	168
	Nord occidentale	48	39(▲)	41(▲)	25(▲)	119	148
	Nord orientale	29	59	49	55	164	180
	Sud-Isole	87	40(▲)	45(▲)	21(▲)	113	173
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>45(▲)</i>	<i>47(▲)</i>	<i>39(▲)</i>	<i>144(▲)</i>	<i>173</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	76(▲)	67(▲)	78(▲)	170	327
	Nord occidentale	61	59(▲)	58(▲)	50(▲)	176	195
	Nord orientale	44	54(▲)	62(▲)	36(▲)	158	233
	Sud-Isole	97	52(▲)	55(▲)	47(▲)	147	204
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>58(▲)</i>	<i>59(▲)</i>	<i>50(▲)</i>	<i>163(▲)</i>	<i>210</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	54(▲)	62(▲)	46(▲)	173(▲)	229
	Nord occidentale	591	50(▲)	54(▲)	40(▲)	150(▲)	219
	Nord orientale	450	52(▲)	57(▲)	48(▲)	157(▲)	230
	Sud-Isole	837	45(▲)	51(▲)	39(▲)	145(▲)	193(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>2313</i>	<i>50(▲)</i>	<i>55(▲)</i>	<i>41(▲)</i>	<i>155(▲)</i>	<i>215(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	55(▲)	62(▲)	47(▲)	169	238
	Nord occidentale	147	58(▲)	59(▲)	47(▲)	161	245
	Nord orientale	109	59(▲)	57(▲)	58(▲)	165	234
	Sud-Isole	159	49(▲)	48(▲)	47(▲)	142	175
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>55(▲)</i>	<i>56(▲)</i>	<i>47(▲)</i>	<i>161(▲)</i>	<i>234</i>
TOTALE	Centro	623	56(▲)	62(▲)	48(▲)	169(▲)	238
	Nord occidentale	857	51(▲)	54(▲)	41(▲)	150(▲)	219(▲)
	Nord orientale	642	53(▲)	57(▲)	49(▲)	161(▲)	230
	Sud-Isole	1201	45(▲)	51(▲)	39(▲)	143(▲)	190(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>3323</i>	<i>50(▲)</i>	<i>55(▲)</i>	<i>42(▲)</i>	<i>155(▲)</i>	<i>220(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.d.4(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo "PATATE E PIATTI A BASE DI PATATE, ESCLUSE LE PATATINE FRITTE" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	4	80	33	26	32	61	61
	Nord occidentale	3	60	19	2	18	21	21
	Nord orientale	4	100	44	45	36	103	103
	Sud-Isole	3	33	33	18	41	47	47
	<i>TOTALE</i>	<i>14</i>	<i>61</i>	<i>33</i>	<i>27</i>	<i>20</i>	<i>103</i>	<i>103</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	13	93	90	50	72	168	168
	Nord occidentale	16	70	44	36	40	119	119
	Nord orientale	14	82	71	42	74	164	164
	Sud-Isole	28	62	62	37	59	108	173
	<i>TOTALE</i>	<i>71</i>	<i>72</i>	<i>65^(▲)</i>	<i>42^(▲)</i>	<i>60^(▲)</i>	<i>145</i>	<i>173</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	21	84	77	50	78	157	194
	Nord occidentale	19	66	83	45	74	191	191
	Nord orientale	15	60	88	40	86	158	158
	Sud-Isole	35	58	79 ^(▲)	47 ^(▲)	68 ^(▲)	161	163
	<i>TOTALE</i>	<i>90</i>	<i>65</i>	<i>81^(▲)</i>	<i>46^(▲)</i>	<i>76^(▲)</i>	<i>161</i>	<i>194</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	160	65	77 ^(▲)	56 ^(▲)	65 ^(▲)	176 ^(▲)	220
	Nord occidentale	225	70	67 ^(▲)	51 ^(▲)	63 ^(▲)	150 ^(▲)	200
	Nord orientale	156	66	71 ^(▲)	56 ^(▲)	63 ^(▲)	178	233
	Sud-Isole	277	63	68 ^(▲)	45 ^(▲)	60 ^(▲)	162 ^(▲)	195
	<i>TOTALE</i>	<i>818</i>	<i>66</i>	<i>70^(▲)</i>	<i>51^(▲)</i>	<i>63^(▲)</i>	<i>163^(▲)</i>	<i>220^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	42	66	75 ^(▲)	63 ^(▲)	64 ^(▲)	202	263
	Nord occidentale	76	79	69 ^(▲)	54 ^(▲)	59 ^(▲)	183	245
	Nord orientale	51	78	76 ^(▲)	57 ^(▲)	64 ^(▲)	171	252
	Sud-Isole	59	65	64 ^(▲)	38 ^(▲)	57 ^(▲)	130	163
	<i>TOTALE</i>	<i>228</i>	<i>72</i>	<i>70^(▲)</i>	<i>53^(▲)</i>	<i>59^(▲)</i>	<i>167^(▲)</i>	<i>245</i>
TOTALE	Centro	240	67	77 ^(▲)	56 ^(▲)	65 ^(▲)	176 ^(▲)	238
	Nord occidentale	339	72	67 ^(▲)	51 ^(▲)	63 ^(▲)	151 ^(▲)	220
	Nord orientale	240	69	72 ^(▲)	54 ^(▲)	63 ^(▲)	171 ^(▲)	234
	Sud-Isole	402	62	68 ^(▲)	44 ^(▲)	59 ^(▲)	156 ^(▲)	190
	<i>TOTALE</i>	<i>1221</i>	<i>67</i>	<i>70^(▲)</i>	<i>51^(▲)</i>	<i>63^(▲)</i>	<i>163^(▲)</i>	<i>220^(▲)</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.d.4(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "PATATE E PIATTI A BASE DI PATATE, ESCLUSE LE PATATINE FRITTE" per classi di età e area geografica: MASCHI dei sol consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	3	50	33	23	42	50	50
	Nord occidentale	2	40	44	58	44	84	84
	Nord orientale	3	50	36	43	16	85	85
	Sud-Isole	4	33	28	34	14	79	79
	<i>TOTALE</i>	<i>12</i>	<i>41</i>	<i>34</i>	<i>33</i>	<i>16</i>	<i>85</i>	<i>85</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	9	60	64	32	59	145	145
	Nord occidentale	19	76	61	40	54	148	148
	Nord orientale	9	75	80	48	65	180	180
	Sud-Isole	23	55	75	43	60	145	173
	<i>TOTALE</i>	<i>60</i>	<i>64</i>	<i>70^(▲)</i>	<i>41^(▲)</i>	<i>59^(▲)</i>	<i>147</i>	<i>180</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	15	75	119	71	114	327	327
	Nord occidentale	23	72	87	56	82	176	195
	Nord orientale	12	63	86	76	84	233	233
	Sud-Isole	27	73	85	48	93	143	204
	<i>TOTALE</i>	<i>77</i>	<i>71</i>	<i>93^(▲)</i>	<i>60^(▲)</i>	<i>87^(▲)</i>	<i>204</i>	<i>327</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	125	67	91 ^(▲)	61 ^(▲)	78 ^(▲)	207	281
	Nord occidentale	204	75	71 ^(▲)	53 ^(▲)	63 ^(▲)	168 ^(▲)	233
	Nord orientale	151	71	81 ^(▲)	52 ^(▲)	78 ^(▲)	181	230
	Sud-Isole	247	62	77 ^(▲)	49 ^(▲)	69 ^(▲)	163 ^(▲)	215
	<i>TOTALE</i>	<i>727</i>	<i>68</i>	<i>79^(▲)</i>	<i>53^(▲)</i>	<i>74^(▲)</i>	<i>179^(▲)</i>	<i>241</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	31	79	82 ^(▲)	58 ^(▲)	72 ^(▲)	221	233
	Nord occidentale	40	78	81 ^(▲)	61 ^(▲)	64 ^(▲)	165	300
	Nord orientale	34	77	74 ^(▲)	50 ^(▲)	64 ^(▲)	165	215
	Sud-Isole	50	74	81 ^(▲)	44 ^(▲)	65 ^(▲)	166	222
	<i>TOTALE</i>	<i>155</i>	<i>77</i>	<i>80^(▲)</i>	<i>53^(▲)</i>	<i>65^(▲)</i>	<i>166</i>	<i>233</i>
TOTALE	Centro	183	69	90 ^(▲)	61 ^(▲)	78 ^(▲)	207 ^(▲)	313
	Nord occidentale	288	75	73 ^(▲)	54 ^(▲)	63 ^(▲)	167 ^(▲)	241
	Nord orientale	209	71	79 ^(▲)	53 ^(▲)	77 ^(▲)	181 ^(▲)	230
	Sud-Isole	351	63	78 ^(▲)	48 ^(▲)	69 ^(▲)	163 ^(▲)	215
	<i>TOTALE</i>	<i>1031</i>	<i>69</i>	<i>79^(▲)</i>	<i>53^(▲)</i>	<i>71^(▲)</i>	<i>175^(▲)</i>	<i>233^(▲)</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.d.4(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "PATATE E PIATTI A BASE DI PATATE, ESCLUSE LE PATATINE FRITTE" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei soli consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	%(*)	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	7	64	33	23	42	61	61
	Nord occidentale	5	50	29	32	18	84	84
	Nord orientale	7	70	41	40	19	103	103
	Sud-Isole	7	33	30	27	16	79	79
	<i>TOTALE</i>	<i>26</i>	<i>50</i>	<i>33</i>	<i>30</i>	<i>18</i>	<i>85</i>	<i>103</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	22	76	79	45	63	145	168
	Nord occidentale	35	73	53(▲)	39(▲)	54(▲)	131	148
	Nord orientale	23	79	74	44	65	164	180
	Sud-Isole	51	59	68(▲)	40(▲)	59(▲)	145	173
	<i>TOTALE</i>	<i>131</i>	<i>68</i>	<i>67(▲)</i>	<i>42(▲)</i>	<i>59(▲)</i>	<i>145</i>	<i>173</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	36	80	95(▲)	62(▲)	82(▲)	194	327
	Nord occidentale	42	69	85(▲)	51(▲)	74(▲)	176	195
	Nord orientale	27	61	87	57	86	210	233
	Sud-Isole	62	64	82(▲)	47(▲)	77(▲)	147	204
	<i>TOTALE</i>	<i>167</i>	<i>68</i>	<i>86(▲)</i>	<i>53(▲)</i>	<i>79(▲)</i>	<i>176(▲)</i>	<i>233</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	285	66	83(▲)	58(▲)	78(▲)	184(▲)	281
	Nord occidentale	429	73	69(▲)	52(▲)	63(▲)	156(▲)	220
	Nord orientale	307	68	76(▲)	54(▲)	66(▲)	179(▲)	230
	Sud-Isole	524	63	73(▲)	47(▲)	63(▲)	163(▲)	195
	<i>TOTALE</i>	<i>1545</i>	<i>67</i>	<i>74(▲)</i>	<i>52(▲)</i>	<i>65(▲)</i>	<i>170(▲)</i>	<i>230(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	73	71	78(▲)	61(▲)	66(▲)	221	263
	Nord occidentale	116	79	73(▲)	57(▲)	59(▲)	166	245
	Nord orientale	85	78	75(▲)	54(▲)	64(▲)	170	252
	Sud-Isole	109	69	72(▲)	41(▲)	59(▲)	156	175
	<i>TOTALE</i>	<i>383</i>	<i>74</i>	<i>74(▲)</i>	<i>53(▲)</i>	<i>63(▲)</i>	<i>166(▲)</i>	<i>245</i>
TOTALE	Centro	423	68	82(▲)	58(▲)	73(▲)	184(▲)	263
	Nord occidentale	627	73	70(▲)	52(▲)	63(▲)	161(▲)	229
	Nord orientale	449	70	76(▲)	54(▲)	65(▲)	178(▲)	233
	Sud-Isole	753	63	73(▲)	46(▲)	63(▲)	163(▲)	195
	<i>TOTALE</i>	<i>2252</i>	<i>68</i>	<i>74(▲)</i>	<i>52(▲)</i>	<i>65(▲)</i>	<i>168(▲)</i>	<i>233(▲)</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.d.5(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "PATATINE FRITTE" per classi di età e area geografica: FEMMINE del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	5	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	5	0	0	0	0	0
	Nord orientale	4	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	9	0	0	0	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	14	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	23	4	13	0	33	50
	Nord orientale	17	3	6	0	20	20
	Sud-Isole	45	1(▲)	3(▲)	0(▲)	5	17
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>2(▲)</i>	<i>7(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>17</i>	<i>50</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	25	2	4	0	10	13
	Nord occidentale	29	2	5	0	10	22
	Nord orientale	25	1	4	0	8	17
	Sud-Isole	60	1(▲)	4(▲)	0(▲)	10	20
	<i>TOTALE</i>	<i>139</i>	<i>1(▲)</i>	<i>4(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>10</i>	<i>20</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	248	1(▲)	4(▲)	0(▲)	0(▲)	20
	Nord occidentale	320	1(▲)	3(▲)	0(▲)	0(▲)	22
	Nord orientale	237	0(▲)	2(▲)	0(▲)	0(▲)	8
	Sud-Isole	440	0(▲)	4(▲)	0(▲)	0(▲)	10
	<i>TOTALE</i>	<i>1245</i>	<i>1(▲)</i>	<i>3(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>17(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	64	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	Nord occidentale	96	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	Nord orientale	65	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	Sud-Isole	91	0(▲)	0(▲)	0(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>316</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0</i>
TOTALE	Centro	356	1(▲)	3(▲)	0(▲)	0(▲)	17
	Nord occidentale	473	1(▲)	4(▲)	0(▲)	0(▲)	22
	Nord orientale	348	0(▲)	3(▲)	0(▲)	0(▲)	13
	Sud-Isole	645	0(▲)	3(▲)	0(▲)	0(▲)	10
	<i>TOTALE</i>	<i>1822</i>	<i>1(▲)</i>	<i>3(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>0(▲)</i>	<i>17(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.d.5(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "PATATINE FRITTE" per classi di età e area geografica: MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	6	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	5	0	0	0	0	0
	Nord orientale	6	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	12	3	9	0	30	30
	<i>TOTALE</i>	<i>29</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	15	1	4	0	17	17
	Nord occidentale	25	3	7	0	17	27
	Nord orientale	12	1	2	0	8	8
	Sud-Isole	42	1 ^(▲)	6 ^(▲)	0 ^(▲)	10	35
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>2^(▲)</i>	<i>5^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>10</i>	<i>35</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	20	2	4	0	12	13
	Nord occidentale	32	4 ^(▲)	9 ^(▲)	0 ^(▲)	22	33
	Nord orientale	19	1	3	0	10	10
	Sud-Isole	37	3 ^(▲)	11 ^(▲)	0 ^(▲)	15	62
	<i>TOTALE</i>	<i>108</i>	<i>3^(▲)</i>	<i>8^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>15</i>	<i>33</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	187	0 ^(▲)	3 ^(▲)	0 ^(▲)	0 ^(▲)	17
	Nord occidentale	271	1 ^(▲)	5 ^(▲)	0 ^(▲)	10 ^(▲)	22
	Nord orientale	213	1 ^(▲)	6 ^(▲)	0 ^(▲)	8 ^(▲)	23
	Sud-Isole	397	0 ^(▲)	4 ^(▲)	0 ^(▲)	0 ^(▲)	33
	<i>TOTALE</i>	<i>1068</i>	<i>1^(▲)</i>	<i>5^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>1^(▲)</i>	<i>22^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	39	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0	0
	Nord occidentale	51	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0	0
	Nord orientale	44	0 ^(▲)	1 ^(▲)	0 ^(▲)	0	4
	Sud-Isole	68	0 ^(▲)	0	0 ^(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>202</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>0</i>
TOTALE	Centro	267	0 ^(▲)	3 ^(▲)	0 ^(▲)	0 ^(▲)	17
	Nord occidentale	384	1 ^(▲)	5 ^(▲)	0 ^(▲)	10 ^(▲)	27
	Nord orientale	294	1 ^(▲)	5 ^(▲)	0 ^(▲)	8 ^(▲)	23
	Sud-Isole	556	1 ^(▲)	5 ^(▲)	0 ^(▲)	0 ^(▲)	33
	<i>TOTALE</i>	<i>1501</i>	<i>1^(▲)</i>	<i>5^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>4^(▲)</i>	<i>22^(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.d.5(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "PATATINE FRITTE" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI del campione totale

Classi di età (anni)	Area geografica	n	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	11	0	0	0	0	0
	Nord occidentale	10	0	0	0	0	0
	Nord orientale	10	0	0	0	0	0
	Sud-Isole	21	1	7	0	0	30
	<i>TOTALE</i>	<i>52</i>	<i>1^(▲)</i>	<i>4^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>0</i>	<i>30</i>
Bambini (3-9 anni)	Centro	29	1	3	0	0	17
	Nord occidentale	48	4 ^(▲)	10 ^(▲)	0 ^(▲)	27	50
	Nord orientale	29	2	5	0	10	20
	Sud-Isole	87	1 ^(▲)	4 ^(▲)	0 ^(▲)	10	35
	<i>TOTALE</i>	<i>193</i>	<i>2^(▲)</i>	<i>6^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>10^(▲)</i>	<i>35</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	45	2 ^(▲)	4 ^(▲)	0 ^(▲)	10	13
	Nord occidentale	61	3 ^(▲)	7 ^(▲)	0 ^(▲)	22	33
	Nord orientale	44	1 ^(▲)	3 ^(▲)	0 ^(▲)	8	17
	Sud-Isole	97	2 ^(▲)	7 ^(▲)	0 ^(▲)	10	62
	<i>TOTALE</i>	<i>247</i>	<i>2^(▲)</i>	<i>6^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>10^(▲)</i>	<i>22</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	435	1 ^(▲)	3 ^(▲)	0 ^(▲)	0 ^(▲)	17
	Nord occidentale	591	1 ^(▲)	4 ^(▲)	0 ^(▲)	6 ^(▲)	22
	Nord orientale	450	1 ^(▲)	5 ^(▲)	0 ^(▲)	4 ^(▲)	13
	Sud-Isole	837	0 ^(▲)	4 ^(▲)	0 ^(▲)	0 ^(▲)	10 ^(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>2313</i>	<i>1^(▲)</i>	<i>4^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>17^(▲)</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	103	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0	0
	Nord occidentale	147	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0	0
	Nord orientale	109	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0	0
	Sud-Isole	159	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0 ^(▲)	0	0
	<i>TOTALE</i>	<i>518</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>0</i>
TOTALE	Centro	623	1 ^(▲)	3 ^(▲)	0 ^(▲)	0 ^(▲)	17
	Nord occidentale	857	1 ^(▲)	5 ^(▲)	0 ^(▲)	8 ^(▲)	22 ^(▲)
	Nord orientale	642	1 ^(▲)	4 ^(▲)	0 ^(▲)	4 ^(▲)	13
	Sud-Isole	1201	1 ^(▲)	4 ^(▲)	0 ^(▲)	0 ^(▲)	15 ^(▲)
	<i>TOTALE</i>	<i>3323</i>	<i>1^(▲)</i>	<i>4^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>0^(▲)</i>	<i>20^(▲)</i>

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: n ≥ 30 per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); n ≥ 160 per P95 e n ≥ 800 per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.d.6(a) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "PATATINE FRITTE" per classi di età e area geografica: FEMMINE dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
Bambini (3-9 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	3	13	33	17	33	50	50
	Nord orientale	5	29	11	5	8	20	20
	Sud-Isole	3	7	11	6	10	17	17
	<i>TOTALE</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>17</i>	<i>14</i>	<i>10</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	5	20	10	2	10	13	13
	Nord occidentale	4	14	12	6	10	22	22
	Nord orientale	2	8	12	6	12	17	17
	Sud-Isole	6	10	10	6	10	20	20
	<i>TOTALE</i>	<i>17</i>	<i>12</i>	<i>11</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>22</i>	<i>22</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	12	5	15	8	15	30	30
	Nord occidentale	12	4	14	11	8	40	40
	Nord orientale	8	3	11	8	8	31	31
	Sud-Isole	13	3	14	17	10	67	67
	<i>TOTALE</i>	<i>45</i>	<i>4</i>	<i>14^(▲)</i>	<i>12^(▲)</i>	<i>10^(▲)</i>	<i>31</i>	<i>67</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--
TOTALE	Centro	17	5	14	7	10	30	30
	Nord occidentale	19	4	17	13	10	50	50
	Nord orientale	15	4	11	7	8	31	31
	Sud-Isole	22	3	13	13	10	22	67
	<i>TOTALE</i>	<i>73</i>	<i>4</i>	<i>14^(▲)</i>	<i>11^(▲)</i>	<i>10^(▲)</i>	<i>33</i>	<i>67</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.d.6(b) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "PATATINE FRITTE" per classi di età e area geografica: MASCHI dei soli consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	1	8	30	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>30</i>	--	--	--	--
Bambini (3-9 anni)	Centro	1	7	17	--	--	--	--
	Nord occidentale	5	20	14	8	10	27	27
	Nord orientale	1	8	8	--	--	--	--
	Sud-Isole	4	10	14	15	10	35	35
	<i>TOTALE</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>14</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>35</i>	<i>35</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	4	20	9	5	10	13	13
	Nord occidentale	9	28	16	9	10	33	33
	Nord orientale	2	11	9	2	9	10	10
	Sud-Isole	4	11	24	25	13	62	62
	<i>TOTALE</i>	<i>19</i>	<i>18</i>	<i>15</i>	<i>13</i>	<i>10</i>	<i>62</i>	<i>62</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	5	3	16	11	10	33	33
	Nord occidentale	23	8	13	11	10	38	51
	Nord orientale	18	8	12	18	8	82	82
	Sud-Isole	8	2	24	20	23	50	50
	<i>TOTALE</i>	<i>54</i>	<i>5</i>	<i>15^(▲)</i>	<i>15^(▲)</i>	<i>10^(▲)</i>	<i>50</i>	<i>82</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	1	2	4	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	--	--	--	--
TOTALE	Centro	10	4	13	9	10	33	33
	Nord occidentale	37	10	14 ^(▲)	10 ^(▲)	10 ^(▲)	38	51
	Nord orientale	22	7	11	17	8	23	82
	Sud-Isole	17	3	22	19	13	62	62
	<i>TOTALE</i>	<i>86</i>	<i>6</i>	<i>15^(▲)</i>	<i>14^(▲)</i>	<i>10^(▲)</i>	<i>50</i>	<i>82</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (▲) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

Tabella 1.A.d.6(c) - Media, deviazione standard, mediana e alti percentili del consumo giornaliero (g/die) del sottogruppo alimentare "PATATINE FRITTE" per classi di età e area geografica: FEMMINE E MASCHI dei solì consumatori

Classi di età (anni)	Area geografica	n	% ^(*)	Media	DS ^(*)	Mediana	P95	P99
Bambini piccoli (0-2 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	0	0	--	--	--	--	--
	Sud-Isole	1	5	30	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>30</i>	--	--	--	--
Bambini (3-9 anni)	Centro	1	3	17	--	--	--	--
	Nord occidentale	8	17	21	15	17	50	50
	Nord orientale	6	21	10	5	8	20	20
	Sud-Isole	7	8	12	11	10	35	35
	<i>TOTALE</i>	<i>22</i>	<i>11</i>	<i>15</i>	<i>12</i>	<i>10</i>	<i>35</i>	<i>50</i>
Adolescenti (10-17 anni)	Centro	9	20	9	4	10	13	13
	Nord occidentale	13	21	15	8	10	33	33
	Nord orientale	4	9	10	4	9	17	17
	Sud-Isole	10	10	16	17	10	62	62
	<i>TOTALE</i>	<i>36</i>	<i>15</i>	<i>13^(*)</i>	<i>10^(*)</i>	<i>10^(*)</i>	<i>33</i>	<i>62</i>
Adulti (18-64 anni)	Centro	17	4	15	9	13	33	33
	Nord occidentale	35	6	14 ^(*)	11 ^(*)	10 ^(*)	40	51
	Nord orientale	26	6	12	16	8	31	82
	Sud-Isole	21	3	18	18	10	50	67
	<i>TOTALE</i>	<i>99</i>	<i>4</i>	<i>14^(*)</i>	<i>14^(*)</i>	<i>10^(*)</i>	<i>50</i>	<i>82</i>
Anziani (65-97 anni)	Centro	0	0	--	--	--	--	--
	Nord occidentale	0	0	--	--	--	--	--
	Nord orientale	1	1	4	--	--	--	--
	Sud-Isole	0	0	--	--	--	--	--
	<i>TOTALE</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	--	--	--	--
TOTALE	Centro	27	4	13	8	10	30	33
	Nord occidentale	56	7	15 ^(*)	11 ^(*)	10 ^(*)	40	51
	Nord orientale	37	6	11 ^(*)	13 ^(*)	8 ^(*)	31	82
	Sud-Isole	39	3	17 ^(*)	16 ^(*)	10 ^(*)	62	67
	<i>TOTALE</i>	<i>159</i>	<i>5</i>	<i>14^(*)</i>	<i>13^(*)</i>	<i>10^(*)</i>	<i>40</i>	<i>67</i>

(*) Percentuale del numero di consumatori rispetto al campione totale

(*) Deviazione Standard

NOTA BENE: le stime contrassegnate con il simbolo (*) sono da considerarsi rappresentative, in quanto il numero di soggetti è sufficiente rispetto al parametro statistico considerato: $n \geq 30$ per media, DS e mediana (Rizzi, 1992); $n \geq 160$ per P95 e $n \geq 800$ per P99 (Kroes et al. 2002). Si veda sezione "Avviso al lettore" parte B, pp. 1-2.

